

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ

Эпидемический паротит (свинка) - широко распространенное вирусное заболевание, протекающее с поражением железистых органов (чаще слюнных желез, особенно околоушных, реже поджелудочной железы, половых, молочных желез и др.), а также нервной системы (менингит, менингоэнцефалит).

Причины паротита

Источник эпидемического паротита – больной человек, заразный в течение 9 дней болезни, путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Наиболее поражаемый контингент – дети школьного возраста.



У детей в первые дни активной стадией появляется – головная боль, отсутствие аппетита, недомогание, повышение температуры тела до 39,5-40 °С.

Профилактика паротита

Специфической профилактикой является вакцинация детей и взрослых от паротита. Паротитную вакцину вводят в составе тривакцины КПК (корь, паротит, краснуха) или в виде отдельной живой ослабленной вакцины.

- По национальному календарю вакцинации ее вводят в возрасте **1** года и затем в **6-7** лет, перед поступлением в школу, препарат ставят под лопатку или в область плеча.
- Если ребенок в детстве не получал вакцину по причине медотвода или отказа родителей, можно провести вакцинацию уже в подростковом или взрослом возрасте.

Вакцинация проводится только здоровым детям, не имеющим противопоказаний.

